

ANTES DEL TRATAMIENTO

- › No utilice en presencia de alzas.
- › Emplee guantes de protección (de tipo nitrilo), para cualquier manipulación de las tiras.
- › Anote el número de lote en su libro de explotación y la fecha de aplicación del tratamiento.
- › Asegúrese de que las colonias a tratar presenten una buena sensibilidad a la flumetrina. No utilice **Bayvarol®** en caso de tratamiento reciente con flumetrina o con tau-fluvalinato (incluido el año anterior).
- › **Diagnóstico:** Cubrir el fondo de la colmena con una lámina blanca adhesiva, insertar las tiras de Bayvarol y observar la mortalidad de los ácaros Varroa 24 horas después.

¡Eso es todo!
Bayvarol®
no requiere
ninguna preparación
específica ni ningún
intervalo
de temperaturas
en particular.

CÓMO CONOCER LA DOSIFICACIÓN ADECUADA¹

Cada bolsita de **Bayvarol®** contiene 4 tiras.

La dosificación correcta es de **4 tiras por colmena de tamaño clásico (1 cuerpo con más de 5 o 6 cuadros)**, que deberán colocarse en el centro del nido de cría (Figura 1). Las 4 tiras favorecen un **mayor número de puntos de contacto de las abejas** (y, por tanto, de varroa) con el principio activo. Los dos lados de las tiras deberán ser fácilmente accesibles para las abejas (no deberá pegarse ninguna tira contra un cuadro).

- › Para las colmenas de gran tamaño (2 cámaras de cría, de tipo Langstroth), deberán colocarse 4 tiras por cuerpo de colmena. Las tiras **Bayvarol®** pueden unirse entre sí por la base para crear una **tira más larga**, permitiendo el tratamiento de los dos cuerpos de la colmena al mismo tiempo (Figura 2).
- › Para los **núcleos y colonias de menor tamaño** (menos de 5-6 cuadros) **serán suficientes** dos tiras.

El sistema de enganches de las tiras **Bayvarol®** y su **rigidez** permiten una **fácil inserción y colocación en la colmena** (Figura 1).¹

Figura 1



Figura 2



CÓMO APLICAR SU TRATAMIENTO DE BAYVAROL®¹

1. Abra una bolsita de 4 tiras.
2. Doble previamente los ganchos de suspensión para permitir que permanezcan mejor en su sitio sobre los cuadros (Figura 1).
3. Coloque las 4 tiras en la colmena, en el centro de la zona de cría (Figura 1).
Para las colmenas de tamaño inferior o superior, véase las recomendaciones de la parte «Cómo conocer la dosificación adecuada».
4. Deje que las tiras actúen durante un máximo de 6 semanas (recomendamos dejarlas al menos 4 semanas) y luego retírelas. En presencia de larvas, se aconseja dejarlas durante el tiempo máximo para cubrir más generaciones de varroas. No existe un tiempo de espera necesario antes de la colocación de las alzas.



CONSEJOS CLAVE PARA UN TRATAMIENTO ADECUADO

- **No aplique una dosis inferior!** La dosificación apropiada es de 4 tiras por colmena de tamaño clásico (véase el apartado «Cómo conocer la dosificación adecuada» para la dosificación apropiada para las colmenas de tamaño inferior o superior).
- **Coloque bien las tiras.** Estas deberán situarse en el centro del nido de cría. No las coloque en las esquinas de la colmena. Cuelgue las tiras de forma que las abejas puedan acceder a las dos caras para tener un máximo de superficie de contacto con el principio activo.
- **Respete la duración de uso:** 6 semanas máximo (recomendamos dejarlas al menos 4 semanas). Es importante retirar las tiras **Bayvarol®** al finalizar el periodo de tratamiento para preservar la sensibilidad de los ácaros varroa a la flumetrina.

¿Por qué es importante respetar las recomendaciones de empleo?

Caso práctico

En Nueva Zelanda, donde los apicultores utilizan Bayvarol® desde hace varios años, un estudio reveló que entre el **32 y el 50 % de los apicultores aplicaban una dosis inferior del tratamiento, utilizando únicamente 2 tiras por cuerpo de colmena en lugar de 4 tiras.** Sin ningún tipo de sorpresa, ese mismo estudio demostró que los apicultores que no habían respetado las recomendaciones de empleo tenían **mayores posibilidades de describir su tratamiento como «no eficaz».**²

CÓMO CONSERVAR SU TRATAMIENTO DE BAYVAROL®

- Las bolsitas cerradas pueden conservarse **hasta 5 años después de su fabricación** y respetando la fecha de caducidad que figura en cada bolsita, a temperatura inferior a 25°C.
- No reutilice las tiras usadas.



1 - RCP Bayvarol, apartado 4.9 «Posología y vía de administración»

2- Report on the 2021 New Zealand Colony Loss Survey by P. Stahlmann-Brown, Manaaki Whenua - Landcare Research; T. Robertson - Marzo de 2022. Los usuarios de Bayvarol que habían seguido las instrucciones de empleo eran un 10,1 % más susceptibles de describir el tratamiento como «un éxito completo» (p < 0,05) que los usuarios que no habían seguido las instrucciones.

BAYVAROL® 3,6 mg tiras para colmenas – Indicaciones de uso: Para el diagnóstico y control de *Varroa destructor* sensible a flumetrina en abejas. **Contraindicaciones:** Ninguna. **Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:** Lávese las manos después de manipular las tiras, antes de las comidas y después del trabajo. No coma, beba ni fume durante el uso. No abra las bolsas hasta el momento inmediato a su utilización. Evite el contacto de las tiras con la miel que vaya a ser destinada a consumo humano. **Tiempo de espera:** No se requiere tiempo de espera para la miel sea cual sea el momento del año en que se utilice Bayvarol. Otros productos de las abejas no se deberán destinar a consumo humano hasta la primavera siguiente al tratamiento. **Titular de la autorización de comercialización:** Bayer Animal Health GmbH. **Representante:** Véto-Pharma S.A.S. **Nº de registro:** 1713 ESP. vES0223-gp. **Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.** Por favor, consulte a su veterinario, farmacéutico u organización sanitaria. En caso de persistencia de los síntomas, consulte con su veterinario. **Uso Veterinario.**