

Api-Bioxal



Obtenga más información sobre Api-Bioxal

FICHA DE BUENAS PRÁCTICAS DE API-BIOXAL SOLUCIÓN

Equipo de protección individual :

- ✓ Guantes
- ✓ Gafas protectoras

Puntos clave para una eficacia óptima del tratamiento

- ✓ Para maximizar la eficacia del tratamiento, se recomienda utilizar Api-Bioxal® solución **durante el periodo invernal**, cuando se **produce la interrupción natural de la cría**.
- ✓ En primavera o verano, la interrupción de la puesta de la reina puede obtenerse mediante el **enjaulado** de la misma, con el fin de colocar a la colonia en una **situación sin cría**, favorable para la aplicación de Api-Bioxal®.
- ✓ No tratar las colmenas **con las alzas** de miel colocadas ni **durante la recolección de la miel** destinada al consumo humano.
- ✓ Todas las colmenas de un mismo colmenar **deben tratarse simultáneamente** para evitar cualquier reinfestación.

Vida útil



La vida útil de **Api-Bioxal®** solución en **su envase original es de 3 años** después de su fabricación.



Una vez abierta la botella, puede conservarse durante **12 meses**, a **temperatura ambiente**.

Dosificación :

Método por goteo :


Se permite un máximo de dos tratamientos al año (invierno y/o primavera/verano), solo cuando no haya cría o cuando la cría esté en su nivel más bajo.

¿Tiene alguna pregunta sobre Api-Bioxal?

Nuestro responsable técnico puede responder a sus preguntas: info@vetopharma.com

Cómo aplicarlo por goteo :

- ✓ Aplicar con una jeringa **5 ml** de la solución por cada espacio intercuadro ocupado.
La dosis máxima permitida es de 50 ml por colmena por aplicación.
- ✓ Después de la aplicación, **lavarse las manos y la piel** que haya estado en contacto con el medicamento veterinario con agua y jabón.



Distribuido por :



✉ INFO@VETOPHARMA.COM

🌐 WWW.VETO-PHARMA.FR

API-BIOXAL 44,2 MG/ML SOLUCIÓN PARA COLMENAS - Forma farmacéutica: Líquido transparente incoloro-amarillo claro. **Composición en principios activos:** 44,2 mg de ácido oxálico equivalentes a 62,0 mg de ácido oxálico dihidrato. **Indicaciones de uso:** Tratamiento de la varroasis causada por *Varroa destructor* en abejas (*Apis mellifera*). **Contraindicaciones:** Ninguna. **Tiempo de espera:** Miel: cero días. No usar en las colonias con las alzas colocadas o durante la producción de miel. **Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:** Las personas con hipersensibilidad conocida al ácido oxálico deben administrar el medicamento veterinario con precaución. El medicamento veterinario puede irritar la piel y los ojos o causar dermatitis de contacto. Evite el contacto con la piel, ojos y membranas mucosas. Usar un equipo de protección individual consistente en guantes y gafas protectoras al manipular el medicamento veterinario. Después de la aplicación, lávese las manos y la piel que entre en contacto con el medicamento veterinario con agua y jabón. Lave a fondo toda la ropa que entre en contacto con el medicamento veterinario. En caso de contacto con los ojos, aclare bien los ojos con abundante agua corriente y consulte con un médico. En caso de ingestión, no induzca al vómito y consulte con un médico y muéstrele esta advertencia. No comer, beber ni fumar durante la manipulación del medicamento veterinario. Titular de la autorización de comercialización: CHEMICALS LAIF S.p.A. Viale dell'Artigianato n° 13, 35010 Vigonza (PD), Italy. **N° de registro:** 4045 ESP. **Medicamento no sujeto a prescripción veterinaria.** v0226ES-gp